

おもに十勝地方で観察された鳥類記録 1999～2004 (2)

Notes on the Avifauna of Tokachi Prefecture 1999～2004 (2)

池田 亨嘉^{*}
Yukiyoshi IKEDA

ABSTRACT — This list recorded on the observathion of birds in Tokachi prefecture during 1999 to 2004. The records were habitually collected from about thirty persons by electronic mail. In the records, 228 species were observed. The records were able to efficiency collect in this way. But it is not covered all area of Tokachi prifecture.

はじめに

本稿は筆者が電子メールを利用して収集した情報にほぼ限定した鳥類観察記録である。

筆者は1999年4月以来、パソコンの電子メールソフトに登録したメンバーによるバードウォッチング情報の共有を行ってきた。登録メンバー各々の鳥類観察記録を一旦筆者へ電子メールで投稿し、これをある程度読みやすい形に整え、メールソフトのアドレス帳機能を利用してメンバー全員へ一斉に発信するものである。

今回の目録はわずかな例外を除き、そのメンバーからの情報をもとにしている。

観察期間は1999年4月から2004年2月までだった。

観察対象地域は十勝管内全域のほか、広尾町の南西に隣接するえりも町を含んでいる。

なお、観察された種類数、十勝地方で新たに記録された鳥類、情報収集方法やその問題点と利点、資料提供者については、おもに十勝地方で観察された鳥類観察記録 1999～2004 (1) 帯広百年記念館紀要 第22号2004. に記載した。

(2)における掲載目 (order)

本稿では以下の目 (order) について掲載した。これ以外の目については、おもに十勝地方で観察された鳥類観察記録 1999～2004 (1) 帯広百年記念館紀要 第22号2004. に掲載した。

ハト目 COLUMBIFORMES カッコウ目 CUCULIFORMES フクロウ目 STRIGIFORMES
アマツバメ目 APODIFORMES ブッポウソウ目 CORACIIFORMES キツツキ目 PICIFORMES
スズメ目 PASSERIFORMES

凡 例

1. 学名は二名式を用い、和名は種を単位とし、とくに必要がある場合には亜種について述べた。分類学上の配列、学名、和名は「日本産鳥類目録改訂第6版」(日本鳥学会 2000)に従った。12のような下線斜体で表記された番号は同目録の番号である。

^{*}帯広百年記念館学芸員

2. 観察年は西暦の下二桁を用いた。ある鳥が1999年11月と2001年8月と10月に観察された場合(99.11:01.8.10)のように表記した。
3. 記載した種は、観察時の状況や観察者の種の同定能力などから、確実な観察であると筆者が判断したものとした。
4. 観察地や年月は可能な限り記載した。
5. 繁殖については本稿では全般的には触れなかったが、コメントで言及したものは参考文献や卵や雛などの観察記録の有無に因った。
6. 留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥、迷鳥の区分については参考文献をもとに観察記録の実態から、基本的には十勝地方を基準に次のようにした。留鳥：多くが一年中この地域に生息する。夏鳥：春から秋にかけてこの地方に生息する。冬鳥：秋から翌年の春にかけて生息する。旅鳥：秋と春の渡りの時期に生息する。迷鳥：この地域に生息していないとされるが、何らかの原因で迷行してきたと考えられるもの。このほか常に海上に生息する鳥など、はっきりしない場合は記述しなかった。
7. 情報数については、観察頻度を推し量る目安として、電子メールソフトの検索機能を用い、種名で検索し抽出された件数を記載した。

ハト目 COLUMBIFORMES

ハト科 COLUMBIDAE

123. 315 キジバト *Streptopelia orientalis* 夏鳥 情報数 60 件
4月から10月まで山林、平野部の林地、公園などで観察された。

分布：帯広川下流 (01.4; 02.10), 帯広市稲田 (01.4, 5; 02.4, 5, 7; 03.4, 5, 6, 7, 10), 帯広市南町 (01.4), 帯広市石王緑地 (03.4), 十勝川帯広市北部 (01.4; 02.5), 札内川帯広市東部 (03.4), 帯広市緑ヶ丘 (01.5; 02.4), 帯広市帯広の森 (03.6), 芽室町国見山 (01.4; 02.4, 5; 03.5), 鹿追町然別 (01.6), 池田キモントー (01.6; 02.5), 豊頃町育素多沼 (01.9; 02.5, 9), 豊頃町礼文内川 (02.4), 豊頃町幌岡 (02.4; 03.10), 大樹町湧洞 (02.4), 大樹町生花 (02.5; 03.4), 大樹町晩成 (02.5), 幕別町新和 (02.4), 幕別町依田 (02.4), 幕別町明野 (03.4), 中札内村ピョウタンの滝 (02.6), 浦幌町森林公園 (02.10), 浦幌町豊北 (01.4; 02.8; 03.9), 足寄町オンネトー (02.10).

124. 317 アオバト *Sphenurus sieboldii* 夏鳥 情報数 9 件
山林などで観察、あるいはさえずりが確認された。

分布：鹿追町然別 (01.6), 豊頃町湧洞沼 (01.9; 02.5, 6, 8), 浦幌町森林公園 (02.10), 大樹町晩成 (99.6).

カッコウ目 CUCULIFORMES

カッコウ科 CUCULIDAE

125. 319 ジュウイチ *Cuculus fugax* 夏鳥 情報数 1 件
山林で少数が観察された。

分布：中札内村ピョウタンの滝 (02.6).

126. 321 カッコウ *Cuculus canorus* 夏鳥 情報数 17 件
多くは平野部の農耕地や草原、まれに山林の開放地で観察された。

分布：鹿追町然別 (01.6), 池田キモントー (01.6; 02.5, 6), 芽室町国見山 (02.5), 帯広市稲田 (99.6; 02.5, 7; 03.6, 7), 帯広市帯広の森 (03.6), 十勝川帯広市北部 (02.5, 6; 03.6), 十勝川アクアパーク (02.5), 豊頃町育素多沼 (02.5), 豊頃町幌岡 (03.6), 豊頃町長節 (02.5), 中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03.6).

127. 322 ツツドリ *Cuculus saturatus* 夏鳥 情報数 19 件
おもに山地や平野の林内で観察された。

分布：帯広市稲田 (01. 5; 02. 5; 03. 5, 6), 帯広市帯広の森 (03. 5, 6), 帯広市緑ヶ丘 (03. 5), 鹿追町然別 (99. 6; 01. 6), 芽室町国見山 (02. 5), 豊頃町育素多沼 (02. 5), 十勝川帯広市北部 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03. 6).

フクロウ目 STRIGIFORMES

フクロウ科 STRIGIDAE

128. 325 シマフクロウ *Ketupa blakistoni* 留鳥 情報数 1 件
大木が生育する河川沿いの環境に生息する。北海道レッドデータブック絶滅危機種。国指定天然記念物。
分布：足寄町芽登付近 (03. 9).
129. 329 コミミズク *Asio flammeus* 冬鳥 情報数 14 件
海岸の草原などで冬に少数が観察された。2003 年は観察が多かった。
分布：浦幌町豊北 (01. 5; 02. 1, 2; 03. 1), 浦幌町昆布刈石 (03. 1), 十勝川河口左岸 (03. 1), 十勝川河口付近 (03. 12).
131. 335 フクロウ *Strix uralensis* 留鳥 情報数 4 件
平地の森林から山林にかけて生息し、冬に人家に近くに飛来したものが観察された。
分布：足寄町オンネトー (02. 10), 幕別町依田 (03. 3), 帯広市稲田 (04. 2).

アマツバメ目 APODIFORMES

アマツバメ科 APODIDAE

132. 337 ハリオアマツバメ *Hirundapus caudacutus* 夏鳥 情報数 11 件
高山から市街地、海岸で観察された。帯広市街地内の緑地で繁殖の可能性がある。
分布：鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 鹿追町然別 (99. 6), 帯広市帯広神社上空 (02. 6), 帯広川下流 (03. 6), 帯広市稲田 (02. 7; 03. 6), 帯広市緑ヶ丘 (03. 5), 十勝川帯広市北部 (03. 6), 浦幌町豊北 (02. 6).
133. 339 アマツバメ *Apus pacificus* 夏鳥 情報数 5 件
高山から海岸まで観察されたが、ハリオアマツバメよりも観察例は少なかった。
分布：鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 十勝川帯広市北部 (02. 5), 中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03. 6), 浦幌町十勝太 (99. 9).

ブッポウソウ目 CORACIIFORMES

カワセミ科 ALCEDINIDAE

134. 342 アカショウビン *Halcyon coromanda* 旅鳥 情報数 1 件
北海道全体では夏鳥とされているが、十勝管内では少数が通過するのみのようだ。
分布：帯広市稲田 (03. 6).
135. 345 カワセミ *Alcedo atthis* 夏鳥 情報数 11 件
平野部の河川湖沼で観察された。
分布：帯広川下流 (99. 9; 01. 4; 03. 6), 帯広市帯広の森 (01. 6), 帯広市稲田 (02. 4, 5; 03. 4, 5, 6), 豊頃町育素多沼 (02. 9).

ヤツガシラ科 UPUPIDAE

136. 348 ヤツガシラ *Upupa epops* 迷鳥 情報数 2 件
まれな夏鳥とする文献もある。観察はほとんど春に集中していた。

分布：帯広市富士 (01.4), 大樹町市街 (02.4).

キツツキ目 PICIFORMES

キツツキ科 PICIDAE

137. 349 アリスイ *Jynx torquilla* 夏鳥 情報数 11 件
朽ち木などを利用して繁殖する。湿原や河川周辺の疎林で観察された。
分布：帯広市南町 (01.4), 帯広市愛国 (02.6), 十勝川帯広市北部 (02.5; 03.6), 札内川帯広市東部 (03.4), 芽室町国見山 (03.5), 浦幌町愛牛 (03.6).
138. 351 ヤマゲラ *Picus canus* 留鳥 情報数 3 件
山林で観察された。平野部では秋に移動中の個体が観察された。
分布：中札内村ピョウタンの滝 (02.6), 鹿追町然別 (99.6), 帯広市緑ヶ丘 (03.10).
139. 353 クマゲラ *Dryocopus martius* 留鳥 情報数 5 件
針葉樹林帯で繁殖しているが、冬に平野部へ移動した個体も観察された。国指定天然記念物。
分布：鹿追町然別 (99.6; 01.6), 帯広市稲田 (01.11, 12).
140. 355 アカゲラ *Dendrocopos major* 留鳥 情報数 71 件
もっとも普通に観察されるキツツキ類。山林, 市街地, 海岸など多くの地域で観察された。
分布：帯広市稲田 (01.4, 5, 9; 02.4, 5, 7, 11, 12; 03.3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04.1), 十勝川河口付近 (01.4; 03.1), 帯広川下流 (01.4; 02.11; 04.1), 帯広市帯広の森 (03.6; 04.1), 帯広市帯広神社 (01.12), 芽室町国見山 (01.4; 02.4, 5), 十勝川帯広市北部 (01.4; 02.5, 6), 札内川帯広市東部 (03.4), 帯広市緑ヶ丘 (01.5; 03.5; 04.1), 帯広市上札内 (02.4), 帯広市拓成 (03.4), 帯広市石王緑地 (03.4), 鹿追町然別 (01.6), 浦幌町豊北 (02.3), 浦幌町昆布刈石 (04.1), 幕別町依田 (02.4), 浦幌町森林公園 (02.5, 9), 大樹町生花 (02.5), 足寄町オンネトー (02.10), 幕別町新和 (04.2).
141. 356 オオアカゲラ *Dendrocopos leucotos* 留鳥 情報数 4 件
おもに山林で観察された。ここ 10 年で平野部での観察が著しく減少しているようだ。
分布：鹿追町然別 (99.6), 浦幌町炭山 (01.5), 中札内村ピョウタンの滝 (99.6), 幕別町日新 (03.11).
142. 357 コアカゲラ *Dendrocopos minor* 留鳥 情報数 12 件
繁殖しているが夏の記録に乏しい。全道的に見て道東, とくに帯広市周辺で多く観察されるなど特徴的な分布をしている。2003 年以降の観察が減少している。
分布：帯広市稲田 (99.5, 6; 01.4, 5; 02.4, 7), 帯広市緑ヶ丘 (01.5), 帯広市帯広の森 (99.12; 00.5, 12; 02.4), 帯広市大正 (02.4).
143. 358 コゲラ *Dendrocopos kizuki* 留鳥 情報数 29 件
山地, 平野, 海岸までの多くの森林や公園で観察された。
分布：芽室町国見山 (01.4, 6; 02.4, 5; 03.4), 帯広市緑ヶ丘 (01.5; 03.5; 04.1, 2), 帯広市帯広神社 (01.12), 帯広市稲田 (02.7; 03.4, 10; 04.1, 2), 幕別町新和 (04.2), 豊頃町湧洞沼 (01.9), 大樹町生花 (02.4), 大樹町晩成 (02.5), 中札内村ピョウタンの滝 (02.6), 足寄町オンネトー (02.10), 鹿追町然別 (99.6), 浦幌町昆布刈石 (04.1).

スズメ目 PASSERIFORMES

ヒバリ科 ALAUDIDAE

144. 365 ヒバリ *Alauda arvensis* 夏鳥 情報数 60 件
多くの草原や河川敷で観察された。
分布：浦幌町豊北 (01.4; 02.9; 03.3, 9), 浦幌町森林公園 (02.10), 浦幌町新吉野 (02.10), 浦幌町愛牛 (03.6), 豊頃町幌岡 (02.3; 03.3, 6), 豊頃町育素多沼 (02.9), 豊頃町長節 (02.5), 豊頃町礼文内川 (02.4), 帯広市稲田 (99.6; 01.4, 5, 9; 02.4; 03.3, 4, 5, 6), 帯広市大正 (02.4), 帯広市帯広の森 (03.6),

帯広川下流 (01. 3, 4; 03. 4, 6), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5, 6; 03. 6), 札内川帯広市東部 (03. 4), 十勝川アクアパーク (02. 5), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 芽室町国見山 (02. 4, 5; 03. 4), 池田キモントー (02. 4, 5, 6), 幕別町依田 (02. 6), 幕別町明野 (03. 4).

ツバメ科 HIRUNDINIDAE

145. 367 ショウドウツバメ *Riparia riparia* 夏鳥 情報数 13 件
平野部の河川湖沼で多数が観察された。土の崖に穴をあけ営巣する。
分布：帯広川下流 (99. 4; 01. 6; 02. 11; 03. 6), 池田キモントー (01. 6), 十勝川帯広市北部 (02. 5, 6; 03. 6), 豊頃町育素多沼 (02. 5), 浦幌町十勝太 (02. 6), 浦幌町豊北 (02. 9).
146. 368 ツバメ *Hirundo rustica* 夏鳥 情報数 5 件
おもに浦幌町など南十勝で観察された。
分布：浦幌町豊北 (02. 4; 03. 9), 豊頃町幌岡 (02. 6), 豊頃町湧洞 (03. 9), 帯広川下流 (99. 4).
147. 370 コシアカツバメ *Hirundo daurica* 迷鳥 情報数 1 件
浦幌町厚内 (02.11) は衰弱個体が観察された。北海道では夏鳥。十勝と釧路の野鳥 (1987) では記載無し。
分布：浦幌町厚内 (02. 11).
148. 371 イワツバメ *Delichon urbica* 夏鳥 情報数 11 件
山地から海岸近くまで観察され、橋などの人工物での営巣が見られた。
分布：鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 十勝川アクアパーク (02. 5), 豊頃町育素多沼 (02. 5), 浦幌町愛牛 (02. 6; 03. 6), 浦幌町十勝太 (02. 6), 鹿追町然別 (99. 6), 清水町剣山 (03. 6), 帯広市大正 (99. 4).

セキレイ科 MOTACILLIDAE

149. 375 キセキレイ *Motacilla cinerea* 夏鳥 情報数 22 件
山林から海岸までの河川沿いで観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4; 03. 5, 6, 7), えりも町黄金道路沿岸 (01. 4), 帯広市拓成 (01. 4), 鹿追町然別 (01. 6), 芽室町国見山 (02. 4; 03. 4), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6).
150. 376 ハクセキレイ *Motacilla alba* 留鳥 情報数 68 件
冬には観察が減少するため、夏に渡来して繁殖するものも多いようだ。高山以外の多くの河川湖沼や開けた環境で観察された。
分布：帯広川下流 (01. 3, 4, 12; 02. 10, 11; 03. 1, 9, 10), 十勝川アクアパーク (01. 4; 02. 1, 3, 5, 11; 03. 3), 帯広市稲田 (01. 4; 02. 4, 5, 7; 03. 5, 12), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市緑ヶ丘 (03. 5), 帯広市上札内 (02. 4), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5; 03. 6), 鹿追町然別 (01. 6), 帯広市大正 (02. 4), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 幕別町依田 (02. 6), 池田キモントー (02. 4), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 豊頃町幌岡 (02. 4; 03. 3), 豊頃町育素多沼 (02. 5), 豊頃町長節 (02. 5), 豊頃町湧洞 (03. 9), 豊頃町大津 (02. 8), 浦幌町厚内 (02. 9), 浦幌町豊北 (03. 9), 浦幌町十勝太 (01. 4, 9; 02. 9; 03. 6), 浦幌町森林公園 (02. 10), 大樹町晩成 (02. 4), 大樹町生花 (02. 5).
151. 377 セグロセキレイ *Motacilla grandis* 留鳥 情報数 18 件
平野部で繁殖期の観察は少なかった。ほとんどが河川水辺で観察された。
分布：帯広川下流 (01. 6; 02. 10, 11; 03. 3, 10), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 04. 2), 足寄町オンネトー (02. 10), 十勝川アクアパーク (03. 3), 帯広市稲田 (03. 10).
152. 381 ビンズイ *Anthus hodgsoni* 夏鳥 情報数 19 件
山地から海岸近くの林内で観察された。
分布：豊頃町長節 (02. 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 7; 03. 5, 6, 7, 10), 芽室町国見山 (01. 4), 鹿追町然別 (99. 6; 01. 6), 浦幌町厚内 (02. 5), 浦幌町森林公園 (02. 10), 大樹町生花 (02. 5).

153. 384 タヒバリ *Anthus spinoletta* 旅鳥 情報数 9 件
秋または春に河川湖沼周辺で観察された。
分布：帯広川下流 (02. 10), 浦幌町十勝太 (02. 10), 浦幌町豊北 (03. 10), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 帯広市川西 (02. 4), 豊頃町育素多沼 (02. 10).

ヒヨドリ科 PYCNONOTIDAE

154. 388 ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis* 留鳥 情報数 73 件
山林から海岸まで、とくに市街地で頻繁に観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 7, 11, 12; 03. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04. 1), 帯広市緑ヶ丘 (02. 4; 03. 5; 04. 1), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市石王緑地 (03. 4), 帯広市帯広神社 (01. 12; 03. 12), 帯広川下流 (02. 11; 03. 9, 10), 帯広市帯広の森 (04. 1), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4), 十勝川帯広市北部 (02. 5, 6; 03. 6), 札内川帯広市東部 (03. 4), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 浦幌町厚内 (02. 2), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 豊頃町幌岡 (03. 3), 豊頃町大津 (04. 1), 大樹町晩成 (02. 4, 5), 足寄町オンネトー (02. 10).

モズ科 LANIIDAE

155. 390 モズ *Lanius bucephalus* 夏鳥 情報数 35 件
河川湖沼, 草原や農耕地で観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4; 03. 5, 6, 10), 帯広川下流 (03. 6), 帯広市愛国 (02. 6), 十勝川帯広市北部 (02. 5, 6; 03. 6), 札内川帯広市東部 (03. 4) 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 豊頃町幌岡 (02. 4), 豊頃町湧洞 (03. 10), 豊頃町育素多沼 (99. 9; 02. 9), 浦幌町厚内 (02. 5), 浦幌町豊北 (03. 9), 浦幌町十勝太 (02. 4, 9; 03. 6), 池田キモントー (02. 5, 6), 大樹町晩成 (02. 5).
156. 391 アカモズ *Lanius cristatus* 夏鳥 情報数 3 件
草原や疎林で少数が観察された。
分布：十勝川帯広市北部 (01. 6; 02. 5, 6).
157. 393 オオモズ *Lanius excubitor* 冬鳥 情報数 4 件
海岸の湿原地帯, まれに農耕地の疎林で観察された。
分布：浦幌町十勝太 (02. 3), 浦幌町愛牛 (02. 3), 豊頃町大津 (03. 3), 帯広市帯広の森 (99. 12).

レンジャク科 BOMBYCILLIDAE

158. 395 キレンジャク *Bombycilla garrulus* 冬鳥 情報数 13 件
市街地の街路樹で多数観察されたほか, 海岸の原生花園でコケモモなどを採食するものが観察された。
分布：音更町木野 (02. 1), 音更町下土幌 (04. 2), 帯広市緑ヶ丘 (02. 1; 03. 1; 04. 1), 帯広市南の森 (04. 1), 帯広市稲田 (04. 1, 2), 帯広市西 16 条南 6 (04. 1), 帯広市帯広の森 (04. 1), 浦幌町厚内 (02. 1), 浦幌町豊北 (02. 1), 幕別町札内 (04. 2).
159. 396 ヒレンジャク *Bombycilla japonica* 冬鳥 情報数 2 件
少数が街路樹などで観察された。
分布：帯広市稲田 (03. 3), 帯広市東 4 南 19 (04. 1).

カワガラス科 CINCLIDAE

160. 397 カワガラス *Cinclus pallasii* 留鳥 情報数 3 件
河川上流で観察された。

分布：鹿追町シイシカリベツ川 (01.6)，中札内村ピョウタンの滝 (02.6)，中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03.6)。

ミソサザイ科 TROGLODYTIDAE

161. 398 ミソサザイ *Troglodytes troglodytes* 留鳥 情報数 8 件
 繁殖期は山林，冬に平野の林内で観察された。
 分布：鹿追町然別 (99.6; 01.6)，芽室町国見山 (02.4)，大樹町晩成 (02.5)，足寄町オンネトー (02.10)，中札内村西札内 (99.5)，帯広市帯広神社 (04.1)，帯広市帯広の森 (99.12)。

イワヒバリ科 PRUNELLIDAE

162. 401 カヤクグリ *Prunella rubida* 夏鳥 情報数 1 件
 高山部に多数生息するとされ，針葉樹林帯で観察された。
 分布：足寄町オンネトー (02.10)。

ツグミ科 TURDIDAE

163. 402 コマドリ *Erithacus akahige* 夏鳥 情報数 7 件
 日高山脈山麓でおもに観察された。
 分布：鹿追町然別 (99.6; 01.6)，中札内村ピョウタンの滝 (02.6)，中札内村西札内 (99.5)，中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03.6)。

164. 405 ノゴマ *Luscinia calliope* 夏鳥 情報数 20 件
 河川湖沼周辺の草原・疎林，あるいは高山のやぶで観察された。
 分布：十勝川帯広市北部 (01.6; 02.5, 6; 03.6)，帯広市稲田 (99.6; 02.5; 03.6, 7)，帯広市愛国 (02.6)，帯広市帯広の森 (03.6)，池田キモントー (02.5)，豊頃町長節 (02.5)，浦幌町厚内 (02.5)，浦幌町豊北 (01.5; 02.6)，浦幌町十勝太 (03.6)，中札内村コイカクシュサツナイ岳 (03.6)。

165. 407 コルリ *Luscinia cyane* 夏鳥 情報数 13 件
 おもに山地に生息するが，平野の林内でもさえずりが確認された。
 分布：鹿追町然別 (99.6; 00.6; 01.6)，芽室町国見山 (02.5)，浦幌町森林公園 (02.5)，中札内村ピョウタンの滝 (02.6)，帯広市緑ヶ丘 (03.5)，帯広市帯広の森 (03.6)，帯広市稲田 (03.6, 7)。

166. 408 ルリビタキ *Tarsiger cyanurus* 夏鳥 情報数 4 件
 おもに針葉樹林帯で観察された。
 分布：鹿追町然別 (99.6; 01.6)，足寄町オンネトー (02.10)，中札内村西札内 (99.5)。

167. 410 ジョウビタキ *Phoenicurus auroreus* 冬鳥 情報数 2 件
 少数が疎林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (03.3)，幕別町新和 (04.2)。

168. 411 ノビタキ *Saxicola torquata* 夏鳥 情報数 45 件
 農地周辺，河川敷などの草原など広い範囲で観察された。
 分布：帯広市南町 (01.4)，帯広市稲田 (01.5; 02.4; 03.4, 5, 6, 7)，帯広市大正 (02.4)，帯広市上札内 (02.4)，帯広市愛国 (02.6)，帯広市帯広の森 (03.6)，帯広川下流 (00.4)，十勝川帯広市北部 (01.4; 02.5, 6; 03.6)，札内川帯広市東部 (03.4)，芽室町北伏古 (03.4)，鹿追町シイシカリベツ川 (01.6)，豊頃町育素多沼 (02.4)，豊頃町礼文内川 (02.4)，豊頃町幌岡 (03.6)，池田キモントー (02.5, 6)，豊頃町湧洞 (02.4, 9; 03.9)，大樹町晩成 (02.4)，大樹町浜大樹 (02.7)，大樹町生花 (03.4)，浦幌町留真 (02.5)，浦幌町愛牛 (03.6)，浦幌町豊北 (01.9; 02.6, 8; 03.6, 9, 10)，浦幌町十勝太 (02.6)，中札内村ピョウタンの滝 (02.6)，幕別町依田 (02.6)。

169. 417 イソヒヨドリ *Monticola solitarius* 夏鳥 情報数 3 件

おもに海岸で繁殖するが、渡り時期に市内を迷行したと思われる個体も観察された。

分布：浦幌町厚内 (02. 4), 豊頃町大津 (02. 8), 帯広市緑ヶ丘 (03. 5)。

170. 419 トラツグミ *Zoothera dauma* 夏鳥 情報数 4 件
おもに山林で観察された。ほとんどがさえずりでの確認。
分布：芽室町国見山 (02. 4, 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 鹿追町然別 (99. 6)。
171. 423 クロツグミ *Turdus cardis* 夏鳥 情報数 13 件
平野から海岸の林地で観察された。
分布：芽室町国見山 (01. 4, 6; 02. 4, 5; 03. 5), 帯広市帯広の森 (02. 4), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 幕別町依田 (02. 4), 大樹町晩成 (99. 6; 02. 6)。
172. 425 アカハラ *Turdus chrysolaus* 夏鳥 情報数 27 件
山麓から海岸までの多くの森林で観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 7; 03. 5, 6, 7, 10), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5), 帯広市帯広の森 (03. 6), 芽室町国見山 (02. 5), 十勝川帯広市北部 (02. 5), 鹿追町然別 (01. 6), 浦幌町森林公園 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5), 大樹町晩成 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6)。
173. 430 ツグミ *Turdus naumanni* 旅鳥 情報数 26 件
秋の観察は少なく、1～4月に多く観察された。
分布：帯広川下流 (01. 4; 03. 2), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 11, 12; 03. 1, 3, 5; 04. 1), 帯広市緑ヶ丘 (04. 1), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市西16条南6 (04. 1), 帯広市東3南19 (04. 1) 十勝川帯広市北部 (01. 4), 足寄町オンネトー (02. 10), 幕別町幌岡 (03. 3), 幕別町明野 (03. 4), 豊頃町大津 (04. 1), 浦幌町豊北 (01. 4; 02. 4; 03. 1, 3), 浦幌町厚内 (03. 1), 浦幌町昆布刈石 (03. 1)。

ウグイス科 SYLVIIDAE

174. 434 ヤブサメ *Urosphena squameiceps* 夏鳥 情報数 15 件
山林, 自然植生の残る市街地内の緑地などで観察された。
分布：芽室町国見山 (99. 6; 01. 4; 02. 4, 5; 03. 4), 帯広市稲田 (01. 5; 03. 5), 帯広市緑ヶ丘 (99. 5; 03. 5), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 幕別町依田 (02. 4), 浦幌町森林公園 (02. 5), 豊頃町湧洞 (02. 5)。
175. 435 ウグイス *Cettia diphone* 夏鳥 情報数 20 件
山地, 平野, 海岸の林地で観察された。
分布：帯広市稲田 (00. 4; 01. 4; 02. 4, 5), 帯広市岩内仙境 (01. 4), 帯広市上札内 (02. 4), 帯広市拓成 (03. 4), 芽室町国見山 (02. 5), 豊頃町湧洞 (02. 4, 5), 豊頃町長節 (02. 5), 浦幌町厚内 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5), 鹿追町然別 (99. 6; 01. 6), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6)。
176. 437 エゾセンニュウ *Locustella fasciolata* 夏鳥 情報数 16 件
山地, 平野, 海岸のやぶが発達した林地で観察された。
分布：十勝川帯広市北部 (01. 6; 03. 6), 十勝川アクアパーク (02. 5), 帯広市稲田 (02. 5, 6; 03. 6, 7), 帯広市帯広の森 (03. 6), 帯広市愛国 (02. 6), 豊頃町長節 (02. 5), 豊頃町幌岡 (03. 6), 浦幌町愛牛 (03. 6), 浦幌町豊北 (02. 8)。
177. 439 シマセンニュウ *Locustella ochotensis* 夏鳥 情報数 10 件
河川湖沼の草原で観察された。
分布：十勝川帯広市北部 (02. 6; 03. 6), 豊頃町湧洞 (01. 6), 豊頃町幌岡 (03. 6), 大樹町晩成 (02. 6), 浦幌町豊北 (02. 6, 8; 03. 6), 浦幌町十勝太 (03. 6), 池田キモントー (99. 6)。
178. 442 コヨシキリ *Acrocephalus bistrigiceps* 夏鳥 情報数 13 件
河川湖沼のまわりの丈の高い草原で観察された。
分布：十勝川帯広市北部 (01. 6; 02. 5, 6; 03. 6), 帯広川下流 (99. 6; 03. 6), 池田キモントー (01. 6; 02. 5, 6), 豊頃町育素多沼 (02. 5, 8, 9), 浦幌町愛牛 (03. 6)。

179. 443 オオヨシキリ *Acrocephalus arundinaceus* 夏鳥 情報数 10 件
 河川湖沼のまわりの丈の高い草原で観察された。観察地域は限定的。
 分布：十勝川帯広市北部 (01. 6 ; 02. 5, 6 ; 03. 6), 池田キモントー (02. 5, 6).
180. 452 メボソムシクイ *Phylloscopus borealis* 旅鳥 情報数 2 件
 さえずりなどから亜種コメボソムシクイ *P. b. borealis* と考えられる。渡りで通過中と思われる少数が、森林で観察された。
 分布：芽室町国見山 (01. 6), 帯広市帯広の森 (03. 6).
181. 453 エゾムシクイ *Phylloscopus borealoides* 夏鳥 情報数 25 件
 山地, 平野, 海岸の森林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (01. 5 ; 02. 5 ; 03. 5, 6, 7), 帯広市大正 (03. 5), 鹿追町然別 (01. 6), 芽室町国見山 (02. 4, 5 ; 03. 5), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 幕別町依田 (02. 4), 浦幌町森林公園 (02. 5), 豊頃町湧洞 (02. 5), 豊頃町長節 (02. 5), 浦幌町愛牛 (03. 6), 大樹町生花 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6).
182. 454 センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus* 夏鳥 情報数 37 件
 山地, 平野, 海岸の森林で多く観察された。
 分布：帯広市稲田 (01. 4 ; 02. 4, 5, 7 ; 03. 5, 6, 7), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5 ; 03. 5), 芽室町国見山 (01. 4 ; 02. 4, 5 ; 03. 5), 十勝川帯広市北部 (02. 5 ; 03. 6), 帯広市愛国 (02. 6), 帯広市大正 (03. 5), 帯広市帯広の森 (03. 6), 十勝川アクアパーク (02. 5), 幕別町依田 (02. 4), 池田キモントー (02. 5, 6), 大樹町生花 (02. 5 ; 03. 4), 豊頃町幌岡 (03. 6), 鹿追町然別 (99. 6).
183. 456 キクイタダキ *Regulus regulus* 留鳥 情報数 10 件
 山地から平地の森林, とくに針葉樹林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (01. 4, 5 ; 02. 5 ; 03. 3, 6), 芽室町国見山 (01. 4 ; 02. 5), 足寄町オンネトー (02. 10), 鹿追町然別 (99. 6).
- ヒタキ科 MUSCICAPIDAE**
184. 460 キビタキ *Ficedula narcissina* 夏鳥 情報数 23 件
 山地, 平野, 海岸の森林, とくに広葉樹林で観察された。
 分布：帯広市緑ヶ丘 (01. 5 ; 03. 5), 鹿追町然別 (99. 6 ; 01. 6), 帯広市稲田 (02. 5, 7 ; 03. 6, 7), 帯広市帯広の森 (03. 6), 芽室町国見山 (02. 5 ; 03. 5), 豊頃町長節 (02. 5), 浦幌町森林公園 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5), 大樹町晩成 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6).
185. 463 オオルリ *Cyanoptila cyanomelana* 夏鳥 情報数 13 件
 河川沿いの森林のほか, 渡りの通過個体が市街地内の緑地で観察された。
 分布：鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 帯広市緑ヶ丘 (02. 4 ; 03. 5), 帯広市稲田 (03. 6), 芽室町国見山 (02. 5 ; 03. 5), 浦幌町森林公園 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6).
186. 464 サメビタキ *Muscicapa sibirica* 夏鳥 情報数 2 件
 針葉樹林帯で観察された。
 分布：鹿追町然別 (00. 6 ; 01. 6).
187. 466 コサメビタキ *Muscicapa dauurica* 夏鳥 情報数 16 件
 多くが平野部の広葉樹林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (99. 6 ; 01. 5, 6 ; 02. 5, 7 ; 03. 5, 6, 7), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5 ; 03. 5), 帯広市帯広神社 (02. 6), 帯広市帯広の森 (03. 6), 芽室町国見山 (02. 5), 浦幌町森林公園 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5).

エナガ科 AEGITHALIDAE

188. 468 エナガ *Aegithalos caudatus* 留鳥 情報数 54 件
平野部の森林に多く、海岸の森林でも観察された。
分布：帯広川下流 (01. 4, 5; 02. 10, 11; 03. 2; 04. 1), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 6; 02. 4, 11, 12; 03. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04. 1, 2), 帯広市帯広神社 (01. 12), 帯広市帯広の森 (04. 1), 芽室町国見山 (99. 6; 01. 4; 02. 4, 5; 03. 4, 5), 幕別町新和 (04. 2), 大樹町晩成小沼 (02. 3), 大樹町生花 (02. 5), 大樹町晩成 (02. 5), 豊頃町湧洞 (02. 6), 浦幌町森林公園 (02. 10).

シジュウカラ科 PARIDAE

189. 470 ハシブトガラ *Parus palustris* 留鳥 情報数 58 件
おもに平野部の広葉樹林や公園で観察された。
分布：豊頃町湧洞 (01. 12; 02. 6; 03. 10), 帯広川下流 (02. 10, 11; 03. 2, 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 9; 02. 4, 5, 7, 11, 12; 03. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 04. 1), 帯広市緑ヶ丘 (02. 4; 03. 5; 04. 1), 帯広市帯広神社 (01. 12; 03. 12), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4, 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 札内川帯広市東部 (03. 4), 鹿追町然別 (01. 6), 大樹町生花 (02. 5; 03. 4), 幕別町新和 (04. 1).
190. 471 コガラ *Parus montanus* 留鳥 情報数 3 件
針葉樹林帯で観察された。ハシブトガラとの判別は野外では難しい種類。
分布：芽室町国見山 (01. 4), 鹿追町然別 (01. 6), 足寄町オンネトー (02. 10).
191. 472 ヒガラ *Parus ater* 留鳥 情報数 52 件
公園を含むあらゆる針葉樹林で観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 6, 7, 11, 12; 03. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04. 1), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 02. 4; 03. 5, 9), 帯広市石王緑地 (03. 4), 帯広市帯広の森 (03. 6; 04. 1), 鹿追町然別 (99. 6; 01. 6), 浦幌町森林公園 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5; 03. 4), 大樹町晩成 (02. 5), 足寄町オンネトー (02. 10).
192. 473 ヤマガラ *Parus varius* 留鳥 情報数 5 件
北海道では普通とされるが、帯広では少なく冬期に見られたため、観察個体は越冬のため移動してきたものと思われる。浦幌町の山林では普通にみられるようだ。
分布：芽室町国見山 (01. 4), 帯広市稲田 (01. 11; 03. 1, 4, 10).
193. 475 シジュウカラ *Parus major* 留鳥 情報数 76 件
山地、平野、市街地、海岸などのあらゆる森林で 1 羽または群れで頻繁に観察された。
分布：帯広川下流 (02. 10; 03. 2, 9, 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 9; 02. 4, 5, 7, 11, 12; 03. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04. 1), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市石王緑地 (03. 4), 芽室町北伏古 (03. 4), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 03. 5; 04. 1), 帯広市帯広神社 (01. 12; 02. 6), 帯広市帯広の森 (03. 6), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 豊頃町湧洞 (02. 5, 10), 豊頃町大津 (02. 2), 豊頃町幌岡 (02. 3; 03. 3), 浦幌町森林公園 (02. 10), 浦幌町昆布刈石 (04. 1), 幕別町新和 (04. 1).

ゴジュウカラ科 SITTIDAE

194. 476 ゴジュウカラ *Sitta europaea* 留鳥 情報数 61 件
山地、平野、市街地、海岸などのあらゆる森林で、1 羽または数羽ずつ頻繁に観察された。
分布：帯広川下流 (02. 10, 11; 03. 2), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 7, 11, 12; 03. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12), 帯広市緑ヶ丘 (02. 4; 03. 5; 04. 1), 帯広市帯広の森 (04. 1), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4, 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 帯広市帯広神社 (01. 12; 03. 12; 04. 1), 中札内村上札内 (02. 4), 鹿追町然別 (01. 6), 浦幌町厚内 (02. 2), 幕別町新和 (02. 4), 幕別町依田 (02. 4), 大樹町晩成 (02. 4), 浦幌町森林公園 (02. 5), 浦幌町昆布刈石 (04. 1), 大樹町生花 (02. 5), 豊頃町湧洞 (02. 6), 足寄町オンネトー (02. 10).

キバシリ科 CERTHIIDAE

195. 477 キバシリ *Certhia familiaris* 留鳥 情報数 29 件
 山地, 平野, 海岸などの森林で, ほとんどが1羽で観察された。
 分布: 帯広川下流 (02. 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 11, 12; 03. 1, 3, 5, 10; 04. 1), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 鹿追町然別 (99. 6), 帯広市上札内 (02. 4), 幕別町新和 (02. 4; 04. 2), 幕別町依田 (02. 4), 大樹町晩成 (02. 5), 足寄町オンネトー (02. 10).

メジロ科 ZOSTEROPIDAE

196. 478 メジロ *Zosterops japonicus* 夏鳥 情報数 16 件
 森林, 河川敷で観察された。20羽ほどの群れが観察されたこともある。近年観察が増加したといわれている。
 分布: 帯広市南町 (01. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 03. 5), 帯広市稲田 (01. 9; 02. 5; 03. 6, 7), 帯広市帯広の森 (02. 4), 帯広川下流 (03. 10), 大樹町晩成 (02. 6), 芽室町国見山 (03. 5).

ホオジロ科 EMBERIZIDAE

197. 481 シラガホオジロ *Emberiza leucocephalos* 冬鳥 情報数 2 件
 十勝と釧路の野鳥 (1987) では未記載。冬に海岸や路側帯の草原で採食中の群れが観察された。
 分布: 豊頃町大津 (00. 11; 03. 1), 豊頃町長節 (03. 2).
198. 482 ホオジロ *Emberiza cioides* 夏鳥 情報数 8 件
 少数が河川敷や農耕地などの開けた環境で観察された。
 分布: 鹿追町市街地周辺 (01. 6), 十勝川帯広市北部 (02. 5), 札内川ダム (99. 5), 十勝川河口左岸 (03. 1), 豊頃町幌岡 (03. 2), 浦幌町豊北 (03. 10), 池田町千代田堰堤 (99. 6).
199. 486 ホオアカ *Emberiza fucata* 夏鳥 情報数 6 件
 河川敷などの草原で観察されたが地域は限定的で, 十勝全体での観察例は少なかった。
 分布: 十勝川帯広市北部 (00. 5; 01. 6; 02. 5, 6; 03. 6), 帯広市帯広の森 (99. 5, 6), 池田キモントー (99. 6).
200. 489 カシラダカ *Emberiza rustica* 冬鳥 情報数 5 件
 林縁部で数羽の群れが観察された。
 分布: 帯広市稲田 (01. 4; 03. 10), 幕別町新和 (04. 2), 豊頃町幌岡 (03. 3).
201. 490 ミヤマホオジロ *Emberiza elegans* 冬鳥 情報数 3 件
 林縁部で少数を観察。
 分布: 帯広市稲田 (02. 12), 幕別町新和 (04. 2), 豊頃町幌岡 (03. 2).
202. 491 シマアオジ *Emberiza aureola* 夏鳥 情報数 2 件
 湿原などで繁殖する夏鳥だが, 以前の記録と比べ, 観察が著しく減少した。
 分布: 池田キモントー (01. 6; 02. 5).
203. 495 アオジ *Emberiza spodocephala* 夏鳥 情報数 68 件
 山地, 平野, 海岸などのあらゆる森林, 林縁部, 疎林で観察された。
 分布: 帯広川下流 (01. 4; 02. 10, 11; 03. 6, 9, 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 9; 02. 4, 5, 7; 03. 4, 5, 6, 7, 10), 帯広市南町 (01. 4), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5, 6; 03. 6), 札内川帯広市東部 (03. 4), 十勝川アクアパーク (02. 5), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 02. 4; 03. 5, 9), 帯広市愛国 (02. 6), 帯広市帯広の森 (03. 6), 鹿追町然別 (01. 6), 豊頃町大津 (02. 4), 豊頃町長節 (02. 5), 中札内村上札内 (02. 4), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 5; 03. 4, 5), 芽室町北伏古 (03. 4), 幕別町新和 (02. 4), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 幕別町依田 (02. 4), 池田キモントー (02. 5, 6), 大樹町生花 (02. 5), 大樹町晩成 (02. 5), 中札内村ピョウタ

ンの滝 (02. 6), 豊頃町幌岡 (03. 6), 豊頃町育素多沼 (02. 5, 9, 10), 浦幌町豊北 (02. 6, 8; 03. 6, 9), 浦幌町森林公園 (02. 10).

204. 496 クロジ *Emberiza variabilis* 夏鳥 情報数 4 件
山林内で繁殖するとされるため、平野部では渡りの途中の個体が観察されたものと思われる。
分布：帯広市稲田 (01. 5, 9; 02. 4), 足寄町オンネトー (02. 10), 中札内村西札内 (99. 5).
205. 498 オオジュリン *Emberiza schoeniclus* 夏鳥 情報数 28 件
おもに十勝南部の河川湖沼周辺の草原で観察された。
分布：豊頃町育素多沼 (02. 4, 9, 10; 03. 10), 大樹町湧洞 (02. 10), 帯広川下流 (99. 9; 01. 4, 6), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5, 6), 池田キモントー (99. 6; 01. 6; 02. 4, 5, 6, 9), 豊頃町大津 (02. 5), 浦幌町十勝太 (02. 6), 浦幌町豊北 (02. 6, 8).
206. 499 ツメナガホオジロ *Calcarius lapponicus* 冬鳥 情報数 3 件
海岸の草原や路側帯で採食中の個体が観察された。
分布：浦幌町豊北 (02. 2), 浦幌町吉野 (03. 1), 豊頃町幌岡 (03. 2).
207. 500 ユキホオジロ *Plectrophenax nivalis* 冬鳥 情報数 3 件
海岸の草原や路側帯で採食中の個体が観察された。
分布：豊頃町吉野 (02. 2), 浦幌町豊北 (03. 1), 豊頃町幌岡 (03. 2).

アトリ科 FRINGILLIDAE

208. 505 アトリ *Fringilla montifringilla* 冬鳥 情報数 14 件
街路樹や公園, 疎林, 酪農家の庭先などで観察された。
分布：浦幌町興部 (02. 2), 浦幌町厚内 (02. 2), 浦幌町森林公園 (02. 10), 浦幌町豊北 (03. 3), 足寄町オンネトー (02. 10), 帯広市稲田 (02. 12), 豊頃町幌岡 (03. 3), 十勝川河口 (03. 3), 豊頃町大津 (04. 1).
209. 506 カワラヒワ *Carduelis sinica* 夏鳥 情報数 78 件
市街地, 農耕地などを中心に数多く観察された。
分布：芽室町北伏古 (03. 4), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 7, 11; 03. 4, 5, 6, 7, 10, 11), 帯広川下流 (01. 4), 帯広市南町 (01. 4), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 4, 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 6; 03. 6), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 03. 5; 04. 5), 鹿追町然別 (01. 6), 帯広市大正 (02. 4), 帯広市上札内 (02. 4), 幕別町新和 (02. 4), 幕別町依田 (02. 4), 幕別町明野 (03. 4), 浦幌町豊北 (02. 4, 6, 8; 03. 1, 9, 10), 浦幌町十勝太 (02. 6, 9), 浦幌町森林公園 (02. 10), 浦幌町愛牛 (03. 6), 豊頃町湧洞 (02. 10; 03. 10), 豊頃町育素多沼 (02. 5, 9), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 豊頃町幌岡 (03. 3, 6), 豊頃町大津 (02. 8; 04. 1), 大樹町晩成 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 池田キモントー (02. 6, 9).
210. 507 マヒワ *Carduelis spinus* 留鳥 情報数 24 件
夏は針葉樹林帯で, 冬は平野の林地で観察された。
分布：帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 7, 12; 03. 1, 3, 4, 5, 10, 12; 04. 1), 帯広市緑ヶ丘 (04. 2), 帯広市森の里 (04. 02), 帯広市帯広の森 (04. 1), 鹿追町然別 (01. 6), 足寄町オンネトー (02. 10), 浦幌町昆布刈石 (04. 1), 幕別町新和 (04. 1).
211. 508 ベニヒワ *Carduelis flammea* 冬鳥 情報数 6 件
枯れ草が積雪の上に露出しているような環境で観察された。
分布：帯広市稲田 (02. 12; 03. 1, 3), 帯広市帯広の森 (00. 11).
212. 510 ハギマシコ *Leucosticte arctoa* 留鳥 情報数 12 件
浦幌町豊北 (03.1) は合計およそ 1,000 羽の群れ。高山で繁殖する鳥類で, 平野や海岸の草原で越冬中のものが観察された。
分布：浦幌町厚内 (02. 1), 浦幌町豊北 (03. 1), 幕別町稲士別川周辺 (03. 2), 豊頃町幌岡 (03. 3), 幕別町明野 (03. 3, 4).

213. 512 オオマシコ *Carpodacus roseus* 冬鳥 情報数 3 件
 海岸の草原や路側帯で採食中の個体が観察された。
 分布：幕別町札内 (04. 2), 浦幌町厚内 (04. 1), 豊頃町大津 (04. 1).
214. 514 イスカ *Loxia curvirostra* 留鳥 情報数 3 件
 高山で繁殖する鳥類で、平野の林内で越冬中のものが観察されたこともある。
 分布：帯広市稲田 (01. 4), 帯広市緑ヶ丘 (02. 4), 鹿追町然別 (01. 6).
215. 516 ベニマシコ *Uragus sibiricus* 夏鳥 情報数 60 件
 河川湖沼周辺の草原で観察された。まれに越冬するものが観察された。
 分布：帯広川下流 (01. 4; 02. 10), 帯広市稲田 (99. 6; 01. 4, 5; 02. 4, 5, 7; 03. 1, 4, 5, 6, 7, 10), 帯広市上札内 (02. 4), 帯広市愛国 (02. 6), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4; 03. 4, 5), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5, 6; 03. 6), 音更町エコロジーパーク (03. 11), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 池田キモントー (01. 6; 02. 5, 6), 浦幌町愛牛 (03. 6), 浦幌町豊北 (02. 4, 8, 9; 03. 9), 浦幌町厚内 (02. 5), 豊頃町育素多沼 (02. 5, 9; 03. 10), 大樹町晩成 (02. 5), 豊頃町湧洞 (01. 9; 02. 10; 03. 10), 豊頃町礼文内川 (02. 4), 十勝川河口付近 (03. 3), 豊頃町旅来 (03. 9).
216. 518 ウソ *Pyrhula pyrrhula* 留鳥 情報数 14 件
 帯広市帯広神社 (01.12) は亜種ベニバラウソ *P. p. cassinii*, 浦幌町市街地 (03.12) は亜種アカウソ *P. p. rosacea*. 繁殖は山地で行うとされるため、平野で観察された個体は越冬か移動中のものと思われる。
 分布：鹿追町然別 (99. 6; 01. 6), 帯広市帯広神社 (01. 12), 帯広市帯広の森 (04. 1), 帯広市稲田 (04. 1), 浦幌町豊北 (02. 2), 浦幌町厚内 (02. 2), 浦幌町市街地 (03. 12), 足寄町オンネトー (02. 10).
217. 520 イカル *Eophona personata* 夏鳥 情報数 4 件
 平野の広葉樹林で繁殖するとされているが、観察例は少なかった。
 分布：浦幌町厚内 (02. 5), 浦幌町愛牛 (02. 6), 中札内村西札内 (99. 5), 芽室町国見山 (99. 6).
218. 521 シメ *Coccothraustes coccothraustes* 夏鳥 情報数 47 件
 山地、平野、海岸の多くの森林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (01. 4, 5, 6; 02. 12; 03. 4, 5, 10, 12), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 02. 4; 03. 5, 9; 04. 1), 帯広川下流 (01. 4; 03. 2, 3), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市愛国 (02. 6), 帯広市石王緑地 (03. 4), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 帯広市帯広神社 (04. 1), 帯広市帯広の森 (04. 1), 幕別町依田 (02. 4), 幕別町新和 (04. 2), 芽室町国見山 (02. 5), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 浦幌町森林公園 (02. 10), 浦幌町豊北 (02. 3), 大樹町晩成 (99. 6).

ハタオリドリ科 PLOCEIDAE

219. 523 ニュウナイスズメ *Passer rutilans* 夏鳥 情報数 21 件
 山地、平野、海岸の森林や疎林で観察された。
 分布：帯広市稲田 (99. 6; 00. 4; 01. 5; 02. 5; 03. 5, 6), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5), 帯広市帯広神社 (02. 6), 十勝川帯広市北部 (03. 6), 芽室町北伏古 (03. 4), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4, 5; 03. 5), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 幕別町新和 (02. 4), 浦幌町豊北 (02. 4), 大樹町晩成 (02. 4), 浦幌町森林公園 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5), 池田キモントー (02. 6).
220. 524 スズメ *Passer montanus* 留鳥 情報数 52 件
 多くの地域の人家周辺で観察された。
 分布：帯広川下流 (02. 10; 03. 2, 10), 帯広市稲田 (01. 4; 02. 4, 5, 11; 03. 3, 5, 6, 11), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5), 十勝川帯広市北部 (02. 5), 札内川帯広市東部 (03. 4), 帯広市西2南5 (04. 2), 芽室町北伏古 (03. 4), 鹿追町市街地周辺 (01. 6), 十勝川アクアパーク (02. 3; 03. 12), 豊頃町幌岡 (02. 4; 03. 3), 豊頃町育素多沼 (02. 5), 浦幌町森林公園 (02. 5) 浦幌町興部 (03. 1), 浦幌町厚内 (03. 3), 浦幌町豊北 (03. 9), 浦幌町十勝太 (03. 6), 浦幌町昆布刈石 (04. 1), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 幕別町新和 (04. 2), 幕別町日新 (04. 2).

ムクドリ科 STURNIDAE

221. 527 コムクドリ *Sturnus philippensis* 夏鳥 情報数 12 件
山地, 平野, 海岸の森林や疎林で観察された。
分布: 鹿追町市街地周辺 (01. 6), 鹿追町然別 (99. 6), 帯広市稲田 (02. 5; 03. 5, 6), 帯広市西7条南5 (03. 6), 浦幌町留真 (02. 5), 大樹町生花 (02. 5).
222. 530 ムクドリ *Sturnus cineraceus* 留鳥 情報数 47 件
山地, 平野, 海岸の疎林や, 堆肥の上, 路肩などで観察された。
分布: 帯広川下流 (01. 3, 4, 12), 帯広市南町 (01. 4), 帯広市稲田 (01. 4; 03. 6, 10), 帯広市緑ヶ丘 (99. 6; 04. 1), 帯広市帯広神社 (02. 6), 十勝川帯広市北部 (02. 6; 03. 6), 鹿追町市街地周辺 (01. 6), 浦幌町豊北 (02. 3, 4, 9; 03. 3, 9), 芽室町国見山 (02. 5), 浦幌町留真 (02. 5), 豊頃町育素多沼 (01. 9; 02. 8, 9, 10), 豊頃町幌岡 (03. 3), 十勝川アクアパーク (03. 3).

カラス科 CORVIDAE

223. 533 カケス *Garrulus glandarius* 留鳥 情報数 30 件
山地で繁殖する。秋に平野部に降りてくる個体が観察されることが多かった。
分布: 帯広川下流 (02. 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5, 9; 02. 5; 03. 10, 11, 12), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5), 鹿追町シイシカリベツ川 (01. 6), 鹿追町然別 (99. 6), 豊頃町湧洞 (01. 9; 03. 10), 大樹町晩成 (02. 4; 03. 3), 浦幌町森林公園 (02. 10), 足寄町オンネトー (02. 10), 幕別町明野 (03. 3).
224. 537 ホシガラス *Nucifraga caryocatactes* 留鳥 情報数 1 件
おもに高山帯で繁殖し, まれに冬平野部に飛来した。
分布: 足寄町オンネトー (02. 10).
225. 539 ミヤマガラス *Corvus frugilegus* 冬鳥 情報数 8 件
十勝と釧路の野鳥 (1987) では未記載。ここ数年十勝南部の酪農地帯で冬に観察されるようになった。
分布: 浦幌町豊北 (03. 1, 3), 浦幌町愛牛 (03. 3, 4, 11; 04. 1, 2), 大樹町生花 (03. 2).
226. 540 ハシボソガラス *Corvus corone* 留鳥 情報数 77 件
山地, 平野, 市街地, 海岸までのあらゆる環境で頻繁に観察された。
分布: 帯広川下流 (01. 4; 02. 10, 11; 03. 1, 2, 9, 10, 12; 04. 1), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 5, 7, 11, 12; 03. 3, 4, 6, 7, 11, 12; 04. 1), 十勝川帯広市北部 (01. 4; 02. 5; 03. 6), 札内川帯広市東部 (03. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 03. 5), 十勝川アクアパーク (02. 3, 5; 03. 10), 中札内村ピョウタンの滝 (02. 6), 芽室町国見山 (01. 4; 02. 4), 鹿追町市街地周辺 (01. 6), 浦幌町豊北 (01. 9; 02. 3; 03. 9, 10), 浦幌町森林公園 (02. 10), 豊頃町幌岡 (03. 3), 豊頃町湧洞 (02. 10; 03. 9, 10), 十勝川河口 (03. 3), 浦幌町厚内 (03. 3), 浦幌町十勝太 (03. 9).
227. 541 ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos* 留鳥 情報数 52 件
山地, 平野, 市街地, 海岸までのあらゆる環境で頻繁に観察された。ハシボソガラスよりもやや少ない。
分布: 帯広川下流 (01. 4; 02. 10; 03. 2, 10), 帯広市稲田 (01. 4, 5; 02. 4, 7, 11, 12; 03. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 04. 1), 帯広市帯広神社 (02. 6), 十勝川帯広市北部 (01. 4), 札内川帯広市東部 (03. 4), 帯広市緑ヶ丘 (01. 5; 03. 5), 芽室町国見山 (01. 4), 浦幌町森林公園 (02. 5, 10), 豊頃町大津 (02. 8), 足寄町オンネトー (02. 10), 豊頃町湧洞 (02. 10), 豊頃町幌岡 (03. 3), 十勝川河口 (03. 3), 浦幌町厚内 (03. 3), 浦幌町豊北 (03. 9, 10).
228. 542 ワタリガラス *Corvus corax* 冬鳥 情報数 1 件
山林内で観察された。近年, シカの死体を食べるために山地内に訪れるようになったようだ。
分布: 足寄町芽登～置戸間 (00. 2).

検討中の種 Species Presently Unaccepted

検討中, 検討中 ヨーロッパコマドリ *Erithacus rubecula* 迷鳥 情報数1件

車道わきのやぶで観察・撮映された。日本産鳥類目録改訂第6版では検討中とされている。亜種の同定の不明、飼育鳥の逸出个体かどうかの検討を要する、論文として公表されていない、という理由のため。

分布：忠類村 (04.2).

謝 辞

本稿作成にあたって、根本国彰、黒澤麗、渡邊有希子、千嶋淳、小林真樹の各氏の協力をいただいているため、記して謝意を表する。

参考文献

- 日本野鳥の会十勝支部・釧路支部 1987. 十勝と釧路の野鳥 十勝・釧路地方鳥類目録.
藤巻裕蔵 1998. 北海道鳥類目録.
浦幌野鳥倶楽部 2000. 浦幌鳥類目録.
日本鳥学会 2000. 日本鳥類目録 改訂第6版.
高野伸二 1985. フィールドガイド 日本の野鳥. (財)日本野鳥の会.
五百沢日丸ほか 2000. 日本の鳥 550 山野の鳥. 文一総合出版.
桐原政志ほか 2000. 日本の鳥 550 水辺の鳥. 文一総合出版.
叶内拓哉ほか 1998. 日本の野鳥. 山と溪谷社.